

Джардінс®  
(емпагліфлозин)

# МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕНІ ДЛЯ ВАС

## В Україні зареєстровано показання для дорослих пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду (СНЗнФВ)\*1

### Примітки

\*Дорослі пацієнти з хронічною серцевою недостатністю (клас NYHA II, III або IV) та зниженою фракцією викиду (ФВЛШ  $\leq 40\%$ )

Література. 1. Джардінс®. Інструкція для медичного застосування, січень 2022. 2. Packer M, Anker S, Butler J, et al. N Engl J Med. 2020;383(15):1413-1424. (EMPEROR-Reduced® results and the publication's Supplementary Appendix).

### Коротка інструкція\* для препарату Джардінс®.

**Склад.** Діюча речовина: емпагліфлозин; 1 таблетка містить емпагліфлозину 10 мг або 25 мг; допоміжні речовини: лактоза, моногідрат та інші.

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті. Інші препарати для зниження рівня глюкози в крові, за винятком інсулінів.

**Показання.** Цукровий діабет 2 типу. Лікування цукрового діабету 2 типу у дорослих, якщо дотримання дієти та фізичні вправи не забезпечують адекватного контролю глікемії: як монотерапія у разі непереносимості метформіну; у комбінації з іншими гіпоглікемізуючими лікарськими засобами. Щодо результатів дослідження комбінованої терапії, зокрема контролю глікемії та серцево-судинних ускладнень, див. розділи «Особливості застосування», «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій» та «Фармакологічні властивості».

Серцева недостатність. ДЖАРДІНС показаний дорослим пацієнтам для лікування симптоматичної хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду.

### Спосіб застосування та дози.\*

**Дозування.** Цукровий діабет 2 типу. Рекомендована початкова доза становить 10 мг емпагліфлозину 1 раз на добу як монотерапія або у складі комбінованої терапії з іншими лікарськими засобами, що застосовуються при цукровому діабеті. Для пацієнтів, які добре переносять емпагліфлозин у дозі 10 мг 1 раз на добу та які мають рШКФ  $\geq 60$  мл/хв/1,73 м<sup>2</sup> і потребують більш суворого глікемічного контролю, дозу можна збільшити до 25 мг 1 раз на добу. Максимальна добова доза становить 25 мг (див. нижче і розділ «Особливості застосування»). У пацієнтів з нирковою недостатністю (рШКФ 30- 60 мл/хв/1,73 м) розпочинати терапію із 10 мг емпагліфлозину.

**Серцева недостатність.** Рекомендована доза пацієнтам із рШКФ  $\geq 20$  мл/хв/1,73 м становить 10 мг емпагліфлозину 1 раз на добу.

**Спосіб застосування.** Таблетки можна приймати з їжею або без їжі, запиваючи

водою, не розжовуючи. У разі пропуску дози її слід прийняти, як тільки пацієнт згадає, проте не слід приймати подвійну дозу препарату в один і той же день.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

**Побічні реакції.\*** Найбільш частою побічною реакцією була гіпоглікемія при застосуванні з сульфонілсечовиною або інсуліном. Повна інформація про побічні реакції наведена у повному обсязі у Інструкції для медичного застосування препарату Джардінс®.

**Категорія відпуску.** За рецептом. **Виробник.** Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина. **Р.П. в Україні:** № UA/14980/01/01, № UA/14980/01/02. Термін дії реєстраційних посвідчень: необмежений з 10.12.2020.

\*Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу Джардінс®.

Інформація про лікарський засіб для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених виключно для професіоналів сфери охорони здоров'я, а також для розповсюдження під час проведення семінарів, конференцій, симпозіумів на медичну тематику або у якості індивідуально спрямованої інформації згідно потреб конкретних професіоналів сфери охорони здоров'я.

При підозрі на побічні реакції, з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до викладеного вище, слід звертатися за телефоном: +380 44 494 12 75, факсом +380 44 494 12 71 або моб. + 380 98 163 7650, або електронною поштою: [PV\\_local\\_Ukraine@boehringer-ingenlheim.com](mailto:PV_local_Ukraine@boehringer-ingenlheim.com)

Питання стосовно медичної інформації, будь ласка, надсилайте на електронну адресу: [MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingenlheim.com](mailto:MEDUABIMedicalInformation.KBP@boehringer-ingenlheim.com)

Представництво «Берінгер Інгельхайм РЦВ ГмбХ енд Ко КГ» в Україні:

04073, м. Київ,  
пр-т Степана Бандери, 28А, 3 поверх;  
тел.: +38 (044) 494-12-75.

 **Boehringer  
Ingelheim**