

ДІЄВА СКЛАДОВА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ



ПЕРШИЙ
ВІТЧИЗНЯНИЙ*



Знижує
артеріальний тиск¹



Поліпшує ліпідний та
вуглеводний обмін²



Сприяє зменшенню
маси тіла³

СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕПАРАТ МОКСОПРЕС (МОХОПРЕС). **СКЛАД:** 1 таблетка містить моксонідину 0,2 мг або 0,4 мг. **ЛІКАРСЬКА ФОРМА.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. **ПОКАЗАННЯ.** Артеріальна гіпертензія. **ПРОТИПОКАЗАННЯ.** Моксонідин протипоказаний при гіперчутливості до діючої речовини або до будь-якого компонента лікарського засобу; синдромі слабкості синусного вузла; брадикардії (частота серцевих скорочень (ЧСС) у спокої нижче 50 уд./хв); атріовентрикулярній (АВ) блокаді II та III ступеня; серцевій недостатності. **ВАГІТНІСТЬ.** Відповідних даних щодо застосування моксонідину у вагітних немає. Дослідження на тваринах продемонстрували ембріотоксичний ефект. Потенційний ризик для людини невідомий. Моксонідин не слід застосовувати протягом вагітності, якщо немає нагальної потреби, **ГОДУВАННЯ ГРУДЬМИ.** Моксонідин проникає у грудне молоко, тому його не слід застосовувати у період годування грудьми. Якщо терапія моксонідином вважається абсолютно необхідною, годування грудьми слід припинити. **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.** Стандартна початкова доза моксонідину становить 0,2 мг на добу. Максимальна разова доза — 0,4 мг. Максимальна добова доза — 0,6 мг — застосовується за 2 прийоми. Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від реакції пацієнта. Моксонідин можна приймати незалежно від прийому їжі, запиваючи невеликою кількістю рідини. **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.** 2 роки. **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.** В оригінальній упаковці. Лікарський засіб не потребує спеціальних умов зберігання, зберігати у недоступному для дітей місці. **УПАКОВКА.** По 10 таблеток у блістері, по 3 блістери в паці. **КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ.** За рецептом. **ВИРОБНИК.** Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Р.п. UA/18998/01/01 UA/18998/01/02 від 13.10.2021 р. **СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:** 1. Moxonidine: a review of its use in essential hypertension Authors: Caroline Fenton, Gillian M, Keating and Katherine A, Lyseng-Williamson Date: Mar, 1, 2006. 2. Treatment of postmenopausal hypertension with moxonidine, a selective imidazoline receptor agonist. Risto Kaaja, Karin Manhem, Jaakko Tuomilehto. Int J Clin Pract Suppl. 2004 Mar; (139): 26–32. 3. Моксонідин у сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії Ю.С. Рудик. Рациональна фармакотерапія. 3 (44) 2017.

*За діючою речовиною за даними реєстрації, наказ МОЗ №2225 від 13.10.2021.

Інформація подана скорочено. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування Моксопрес. Перед використанням препарату обов'язково ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування. Інформація призначена для професійної діяльності лікарів та фармацевтів.